

COVID-19（新型コロナウイルス感染症）の治療について


あなたにはCOVIDに感染したら重症化するリスクがありますか？

感染症が深刻化するリスクが高い方を助ける治療があるかもしれません。

TEST TO TREATプログラムについて

Test to Treatは、COVID-19の検査を受け、陽性結果が出た場合に迅速に無料の治療が行えるよう手助けする新しいプログラムです。

保険の有無や米国在留資格に関係なく治療費はかかりません。



COVID-19の治療は、症状が出てから5日以内に行う必要があります。

対象要件

医療提供者は以下の基準に基づいてあなたが治療対象となるかどうかを判断します

- ✓ COVID-19が重症化するリスクレベル
- ✓ 現在の服用薬
- ✓ 既往歴
- ✓ 年齢（必須条件は12歳以上で体重が少なくとも88ポンド / 40kgであること）

どのようにして治療を受けられますか？

- まず、かかりつけ医にご相談ください。かかりつけ医が、提携薬局や抗ウイルス剤を取り扱う医療機関で調剤してもらえる処方箋を提供してくれます。
- かかりつけ医がいない場合や48時間以内に受診できない場合は、ワシントン州保健局（1-800-525-0127）に連絡し、#を押すか doh.wa.gov/Covid19Telehealth にアクセスして、240カ国語の言語で利用できる無料のテレヘルス（遠隔医療）を予約してください。ビデオ診察を受けることができない方は、電話診察を受けることができます。
- 自宅での（抗原）検査または検査所からの検査結果をテレヘルス訪問時にご持参ください。

よくある質問

Q

Q. Test to Treatプログラムでは、どのような種類の薬がありますか？

A. Test to Treatプログラムには、ファイザー社 (Pfizer) のパキロビッド「リトナビル (Ritonavir) で増強されたニルマトレルビル (Nirmatrelvir)」とメルク社 (Merck) のラゲブリオ (Lagevrio) 「モルヌピラビル (Molnupiravir)」の2つの経口抗ウイルス薬があります。これらの薬は、症状が始まってすぐに服用すると、感染症の重症化や入院の防止に役立ちます。薬はCOVID-19の症状が始まってから5日以内に服用しなければなりません。

A



よくある質問

Q

経口抗ウイルス薬はどのように作用しますか？

経口抗ウイルス治療は、COVID-19の原因となるウイルスの体内増殖を阻止したり、体内のウイルス量を低減させ、免疫系を高めることで、COVID-19と戦う手助けをします。

A



FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

Q

Q. 経口抗ウイルス薬はどのように作用しますか？

A: 現在、Test to Treatプログラムでは提供していませんが、免疫機能が低下している患者は、COVIDの感染予防に役立

Evusheld（エブシェルド）の投薬対象であるかについては、かかりつけ医にお尋ねください。

A



詳細について

Test to Treatプログラムの詳細や最寄りのTest to Treat施設の検索については、
aspr.hhs.gov/TestToTreatをご覧ください。

