

## ФЕНТАНИЛ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ И УЧАЩИХСЯ

К сожалению, в последнее время в округе Кинг возросло количество смертей от передозировки, в основном это обусловлено тем, что в запрещённые законом таблетки и порошки добавлен фентанил. Смертельный исход чаще встречается среди людей в возрасте 18-ти лет и моложе.

### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

- Будьте осторожны и знайте, что есть поддельные таблетки, которые могут выглядеть как лекарства, отпускаемые по рецепту. Они, вероятнее всего, содержат фентанил.
- Не употребляйте таблетки, которые вы не получаете напрямую в аптеке или у своего врача.
- Таблетки, купленные онлайн, не безопасны.

### ЧТО ТАКОЕ ФЕНТАНИЛ?

Фентанил является мощным синтетическим опиоидным препаратом, он примерно в 100 раз сильнее, чем остальные опиоиды. Фентанил часто добавляют в незаконные уличные наркотики, в такие как поддельные таблетки и в белый порошок. Фентанил и другие опиоиды провоцируют передозировку/служат причиной передозировки; при передозировке дыхание замедляется и, в конечном итоге, может наступить смерть.

### КАК ВЫГЛЯДИТ РАСПРОСТРАНЯЕМЫЙ ФЕНТАНИЛ?

- В округе Кинг фентанил чаще всего встречается в поддельных таблетках голубого, зеленоватого или бледно-серого оттенка. Также, таблетки могут иметь другой цвет. Поддельные таблетки могут быть помечены “M30”, иногда как “K9”, “215” и “v48”. Фентанил также добавляют в белый порошок.

**В местном масштабе фентанил обнаружен в следующих субстанциях:**

#### M30 таблетки

В нашем районе это самые распространенные таблетки, содержащие фентанил

#### V48 & A215 таблетки

Эти таблетки, хотя они распространены меньше, тоже могут содержать фентанил

#### Порошок

Фентанил может содержаться в белом порошке



- Таблетки оксикодона, которые продаются на улице или в Интернете, вероятнее всего, содержат фентанил.
- Вы не можете чувствовать запах или вкус фентанила. При осмотре таблеток, вы не определите, есть ли в них фентанил или нет.
- Даже в пределах одной партии количество фентанила может варьироваться между таблетками. В то время как одна таблетка может дать кайф, не убивая человека, следующая таблетка может оказаться смертельной.

## ЧТО ДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ ПРЕДОТВРАТИТЬ СМЕРТЕЛЬНЫЕ ПЕРЕДОЗИРОВКИ:

- Знайте признаки передозировки или момент наступления чрезмерного употребления опиоидов. Человек может иметь передозировку, если:
  - Он не просыпается или его трудно разбудить
  - У него замедленное дыхание или нет дыхания
  - Имеет бледные, пепельные или холодные на ощупь кожные покровы
  - Имеет посиневшие губы или ногти
  - Имеет ненормальный характер храпа (например, необычно громкий)
  - Находится в состоянии чрезвычайной сонливости
- Если вы стали свидетелем чьей-то передозировки, немедленно звоните по телефону 9-1-1. Закон Доброго Самаритянина штата Вашингтон защитит вас и человека, который передозирован наркотиками, по обвинению в хранении наркотиков.
- **Дайте налоксон (Narcan/наркан), назальный спрей, который нейтрализует опасные для жизни последствия передозировки опиоидов.** На сайте [stopoverdose.org](http://stopoverdose.org) узнайте, где можно получить наркан.



- Избавьтесь от неиспользованных или просроченных лекарств. Найдите ближайший к вам специальный медицинский контейнер/дропбок: [www.medicinereturn.org](http://www.medicinereturn.org) или в текстовом сообщении напишите MEDS и отправьте на 667873
- Если вы подозреваете, что человек передозирован, не позволяйте ему снова заснуть.

## ЛЕЧЕНИЕ РАБОТАЕТ

В округе Кинг доступны разнообразные методы лечения для расстройств, связанных с употреблением опиоидов, включая лекарственное лечение. Посетите Линию Помощи по Выздоровлению штата Вашингтон <http://www.WArecoveryhelpline.org> или позвоните по тел. 1-866-789-7511