



فرزند شما به آزمایش سرب خون نیاز دارد، اگر:

- ساکن خانه ساخته شده پیش از 1950 باشد یا مرتباً به چنین ساختمانی رفت و آمد کند
- ساکن خانه ساخته شده پیش از 1978 باشد و این خانه اخیراً یا پیوسته تعمیر یا بهسازی شده باشد، یا مرتباً به چنین ساختمانی رفت و آمد کند
- ساکن پرورشگاه باشد
- دارای دوست یا خواهر/برادری باشد که میزان سرب خون آنها بالا تشخیص داده شده باشد
- پدر/مادر یا سرپرستی داشته باشد که در محل کار یا به واسطه سرگرمیهای خود با سرب سر و کار دارد
- از کشور دیگری به ایالات متحده آمده باشد
- از درمان‌ها یا لوازم آرایشی سنتی استفاده کند
- تحت پوشش Apple Health/Medicaid باشد
(به قسمت زیر مراجعه کنید)

آیا حداقل یکی از کادرهای بالا را علامت زدید؟

کارت زیر با عنوان «فرزندم به آزمایش غربالگری سرب خون» را جدا کنید و در نوبت بعدی معاینه فرزندتان به پزشک تحویل دهید. اگر فرزندتان از طریق **Apple Health** بیمه شده باشد، حتی اگر عامل ریسک دیگری نداشته باشد، می‌توانید از ارائه‌دهنده **Medicaid** آزمایش رایگان دریافت کنید.

فرزندم به آزمایش
غربالگری سرب نیاز دارد.

Public Health
Seattle & King County



Washington State Department of
Health

چرا فرزندم باید تحت آزمایش سرب قرار بگیرد؟

حتی مقادیر کم سرب هم میتواند رشد مغز در کودکان را مختل سازد. اگر سرب وارد بدن کودک شود، ممکن است در فرایندهای یادگیری، تمرکز، و پیشرفت تحصیلی وی اختلال ایجاد کند.

مسمومیت با سرب چه نشانه‌هایی دارد؟

در بیشتر موارد، کودکان آلوده به سرب را نمی‌توان از روی ظاهر یا رفتار تشخیص داد. آزمایش خون یگانه روش ممکن برای تشخیص مسمومیت با سرب است.

چه عواملی سبب مسمومیت با سرب می‌شود؟

غبار و تراشه سرب که از رنگ ساختمان‌های قدیمی در هوا منتشر می‌شود، یکی از مهم‌ترین عوامل مسمومیت است. غبار سرب ممکن است اسباب‌بازی و دست کودک را آلوده کند. وقتی کودک دست یا اسباب‌بازی را به دهان می‌برد، غبار سرب وارد بدن می‌شود. برخی از منابع مسمومیت با سرب عبارت‌اند از:



لوازم آرایشی یا ادویه وارداتی



ظروف سفالی یا دست‌ساز



وینیل، اسباب‌بازی های قدیمی، زیورآلات و کلید



خاک و آب

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره سرب و میزان آلودگی محله خود، مراجعه کنید به: www.doh.wa.gov/lead

ارائه‌دهنده: این کودک بر اساس پرسش‌نامه عامل ریسک سرب DOH ایالت دچار حداقل یکی از عوامل ریسک آلودگی به سرب تشخیص داده شده است.

طبق قانون فدرال کودکان مشمول Medicaid باید در سن 12 و 24 ماهگی تحت آزمایش غربالگری سرب خون قرار بگیرند. کودکان 24 تا 72 ماهه که قبلاً تحت آزمایش غربالگری سرب خون قرار نگرفته‌اند، باید این آزمایش را دریافت کنند.

برای کسب اطلاعات بیشتر به نشانی زیر مراجعه کنید:

www.doh.wa.gov/lead