

適合嬰幼兒的 COVID-19 疫苗接種

父母和監護人的問題與解答



May 12, 2023

COVID-19 疫苗是保護您的孩子免於住院或出現長期症狀的最佳方法。

- 雖然COVID-19在嬰兒和兒童身上通常並不嚴重，但COVID-19可以導致需住院治療的嚴重感染或“長期COVID”。
- 疫苗如同汽車安全座椅：它可以保護小孩子避免受到嚴重危險的可能性，即使不太可能會發生。




接種疫苗有助孩子保持童真。

當孩子們都接種最近新的疫苗，他們可以安全地從事更多他們喜歡的活動，例如上學前班以及與朋友和家人一起在室內活動。



COVID-19 疫苗讓孩子們更安全地與他人相處



讓您的孩子接種疫苗還可以保護家人和朋友，尤其是那些處於高風險中的人。

兒童疫苗安全有效嗎？

是。FDA 確定該疫苗在臨床研究中沒有發現嚴重的安全問題。

接種疫苗的兒童仍有可能感染 COVID，但病情會較輕微。

疫苗能預防最重大的事情：它可以防止住院、嚴重的健康問題和死亡。



什麼類型的COVID-19疫苗可供嬰幼兒接種？



6 個月大以上的兒童可以接種輝瑞 (Pfizer) 或莫德納 (Moderna) COVID-19 疫苗

我的嬰兒或幼兒需要接種多少劑疫苗？

年滿6個月至5歲的兒童可能需要接種多劑的COVID-19疫苗才能算是保有最新的接種狀態，包括至少1劑升級版的輝瑞或莫德納疫苗。這取決於他們之前接種了幾劑疫苗和年齡。

如果您對您需要接種幾劑疫苗有疑問，請諮詢您的醫療保健提供者。



嬰幼兒疫苗裡含有什麼成分？

活性成分：**mRNA**（一種分子，可以教會您的細胞如何識別冠狀病毒，以便它們能夠快速對抗它）

- 輝瑞 (**Pfizer**) 的其他成分：氨基醇、脂質（脂肪）、氯化鈉（鹽）和蔗糖（糖）。
- 莫德納 (**Moderna**) 的其他成分：脂質（脂肪）、乙酸鈉和三水乙酸鈉（鹽）、酸穩定劑和蔗糖（糖）。

兒童疫苗是否**免費**？

是。接種 COVID-19 疫苗**一直是免費的**。

無論移民身份如何或有無保險，華州的兒童都可**免費**接種COVID-19疫苗。



嬰幼兒常見的副作用有哪些？

副作用通常持續一兩天。常見的副作用包括：

- 注射的部位酸痛
- 煩躁和哭鬧
- 嗜睡和倦怠
- 食慾不振

罕見的副作用：噁心/嘔吐、發燒、寒顫、腺體腫脹。

這些都是正常跡象，表示他們的身體正在建立免疫力。



兒童接種疫苗與心肌炎之間**是否**有關聯性？



- 在青少年男性中，接種mRNA 疫苗與一種稱為心肌炎的罕見疾病之間存在關聯性，這是一種心臟炎症。
- 這種情況與 11 歲以下兒童的 COVID-19 疫苗接種**無關**。

兒童接種疫苗與心肌炎之間**是否**有關聯性？

- 針對 5 歲以下兒童接種莫德納 (Moderna) 或輝瑞 (Pfizer) 疫苗所做的研究中，沒有通報病例。
- 一項針對 5 至 11 歲兒童的大型全國性研究發現，與接種疫苗相比，他們因感染 COVID-19 而患心肌炎的可能性更大。



嬰幼兒可到哪裡接種疫苗？



您可以跟：

- 兒科醫生辦公室
- 診所
- 疫苗接種站點


進行預約，有些藥房將能夠為幼兒接種疫苗。

要查找您附近的疫苗接種站點或預約接種時間：

- kingcounty.gov/covid/vaccine/chinese-trad
- 請致電華盛頓州的 COVID-19 信息熱線 1-800-525-0127，然後按#（電話接通時請說出您需要的語言）

在孩子前往疫苗接種預約前，我應該做什麼準備？

- 讓您的孩子穿短袖或易於捲起的寬鬆衣袖。
- 對您的孩子誠實：注射將會痛一會兒或感覺像被掐一下。
- 帶一本書或小玩具以供您的孩子在等候期間使用。



我有困難到達疫苗接種站點。有什麼幫助可以提供嗎？

無障礙輔助：如需殘障便利安排，請發送電子郵件至：
publichealthaccommodations@kingcounty.gov。

語言協助：請致電華盛頓州的 COVID-19 信息熱線 1-800-525-0127，然後按#（電話接通時請說出您需要的語言）

交通：請在上午8時30分至下午4時致電交通資源專線：425-943-6760。或瀏覽 www.FindARide.org。



kingcounty.gov/vaccine/chinese-trad