

了解更多有关 COVID-19疫苗的讯息



	强生 Johnson & Johnson 一剂	辉瑞 Pfizer/ BioNTech 二剂， 间隔三周	莫德纳 Moderna 二剂， 间隔四周
您需要接种几剂剂？	一剂	二剂， 间隔三周	二剂， 间隔四周
您何时算完成全剂量接种？	接种该剂 二周后	接种第二剂 二周后	接种第二剂 二周后
预防严重疾病 (包括 住院和死亡)	极有效	极有效	极有效
预防轻至中度疾病 (发烧、发冷、咳嗽、 喉咙痛等)	非常有效	极有效	极有效
符合资格年龄	十八岁及以上	十六岁及以上	十八岁及以上
有效成分	腺病毒 (Adenovirus) (一种 常见的感冒病毒)，经过改 造而不会引起疾病	信使核糖核酸 (mRNA)， 人体会产生的遗传物质	信使核糖核酸(mRNA)， 人体会产生的遗传物质
常见副作用 (包括手臂酸痛或肿胀、 疲乏、发烧、肌肉酸痛)	<ul style="list-style-type: none"> • 持续时间短 • 相对轻微 	<ul style="list-style-type: none"> • 持续时间短 • 第二剂后更常见 	<ul style="list-style-type: none"> • 持续时间短 • 第二剂后更常见
安全性 (由医学专家认定)	是	是	是

Chinese Simplified 3.17.21

注意：由於临床试验设计的差异，使用百分率比较功效的用处不大。

kingcounty.gov/covid/vaccine/simplified