

了解更多有關 COVID-19疫苗的消息



	強生 Johnson & Johnson 一劑	輝瑞 Pfizer/ BioNTech 二劑， 間隔三週	莫德納 Moderna 二劑， 間隔四週
您需要接種幾針劑？	一劑	二劑， 間隔三週	二劑， 間隔四週
您何時算完成全劑量 接種？	接種該劑 二週後	接種第二劑 二週後	接種第二劑 二週後
預防嚴重疾病 (包括 住院和死亡)	極有效	極有效	極有效
預防輕至中度 疾病 (發燒、發冷、 咳嗽、喉嚨痛等)	非常有效	極有效	極有效
符合資格年齡	十八歲及以上	十六歲及以上	十八歲及以上
有效成分	腺病毒 (Adenovirus) (一種 常見的感冒病毒)，經過改 造而不會引起疾病	信使核糖核酸(mRNA)， 人體會產生的遺傳物質	信使核糖核酸(mRNA)， 人體會產生的遺傳物質
常見副作用 (包括手臂酸痛或腫脹、 疲乏、發燒、肌肉酸痛)	<ul style="list-style-type: none"> 持續時間短 相對輕微 	<ul style="list-style-type: none"> 持續時間短 第二劑後更常見 	<ul style="list-style-type: none"> 持續時間短 第二劑後更常見
安全性 (由醫學專家認定)	是	是	是

Chinese Traditional 3.17.21

注意：由於臨床試驗設計的差異，使用百分率比較功效的用處不大。

kingcounty.gov/covid/vaccine/traditional