

# En savoir plus sur les vaccins contre la COVID-19



	<b>Johnson &amp; Johnson</b>	<b>Pfizer/ BioNTech</b>	<b>Moderna</b>
<b>De combien de doses de vaccin avez-vous besoin ?</b>	Une dose	Deux doses à trois semaines d'intervalle	Deux doses à quatre semaines d'intervalle
<b>Quand est-ce que vous serez considéré comme complètement vacciné ?</b>	2 semaines après une seule dose	2 semaines après la deuxième dose	2 semaines après la deuxième dose
<b>Protection contre une maladie grave (y compris l'hospitalisation et la mort)</b>	Extrêmement efficace	Extrêmement efficace	Extrêmement efficace
<b>Protection contre une maladie légère à modérée (fièvre, frissons, toux, mal de gorge, etc.)</b>	Très efficace	Extrêmement efficace	Extrêmement efficace
<b>Âges éligibles</b>	18 ans et plus	16 ans et plus	18 ans et plus
<b>Ingrédient actif</b>	Adénovirus (un virus du rhume banal), le virus est modifié pour ne pas provoquer la maladie	ARNm, un matériel génétique produit par l'organisme	ARNm, un matériel génétique produit par l'organisme
<b>Effets secondaires communs (y compris des douleurs ou un gonflement dans le bras, la fatigue, la fièvre, des douleurs musculaires)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>De courte durée</li> <li>Relativement légers</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>De courte durée</li> <li>Plus communs après la deuxième dose</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>De courte durée</li> <li>Plus communs après la deuxième dose</li> </ul>
<b>Sans danger (établi par des experts médicaux)</b>	Oui	Oui	Oui

French 3.17.21

Remarque : Il est moins utile de comparer l'efficacité en utilisant des pourcentages car il existe des différences dans la conception des essais cliniques.

[kingcounty.gov/covid/vaccine/french](https://kingcounty.gov/covid/vaccine/french)