

# ស្វែងយល់បន្ថែមអំពីថ្នាំវ៉ាក់សាំងកូវី

## ដ-១៩ COVID-19



តើអ្នកត្រូវការចាក់  
ប៉ុន្មានដូស?

**Johnson &  
Johnson**

មួយដូស

**Pfizer/  
BioNTech**

ពីរដូស/ឃ្លាតពីគ្នាបីសប្តាហ៍

**Moderna**

ពីរដូស/ឃ្លាតពីគ្នាបួនសប្តាហ៍

តើពេលណាទើបថ្នាំវ៉ាក់សាំងមានប្រសិទ្ធភាពពេញលេញក្រោយពីអ្នកបានចាក់រួច?

២ សប្តាហ៍ក្រោយពីដូសទីមួយ

២ សប្តាហ៍ក្រោយពីដូសទីពីរ

២ សប្តាហ៍ក្រោយពីដូសទីពីរ

ការពារទប់ស្កាត់ជំងឺធ្ងន់ធ្ងរ (រួមទាំងឈឺដេកពេទ្យនិងមរណភាព)

មានប្រសិទ្ធភាពខ្លាំងបំផុត

មានប្រសិទ្ធភាពខ្លាំងបំផុត

មានប្រសិទ្ធភាពខ្លាំងបំផុត

ការពារទប់ស្កាត់ជំងឺកម្រិតស្រាលទៅកម្រិតធ្ងន់ (ដូចជា គ្រុន ក្តៅ គ្រុនរងារ ក្អក ឈឺបំពង់ក ល។)

មានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់

មានប្រសិទ្ធភាពខ្លាំងបំផុត

មានប្រសិទ្ធភាពខ្លាំងបំផុត

អាយុមានលក្ខណៈសម្បូរ

ពីអាយុ ១៨ ឆ្នាំឡើងទៅ

ពីអាយុ ១៦ ឆ្នាំឡើងទៅ

ពីអាយុ ១៨ ឆ្នាំឡើងទៅ

ជាតុផ្សំដែលសកម្ម

វីរុស **Adenovirus** (ជាវីរុសផ្លាសាយធម្មតាមួយប្រភេទ) ដែលត្រូវបានកែសម្រួលមិនអាចធ្វើអាយុយើងកើតជំងឺ

**mRNA**, គឺជាសារធាតុមួយដែលបង្កើតឡើងដោយរាងកាយរបស់យើង

**mRNA**, គឺជាសារធាតុមួយដែលបង្កើតឡើងដោយរាងកាយរបស់យើង

ផលប៉ះពាល់ទូទៅ (មានរួមទាំង ឈឺឬហឺមដៃអស់ កម្លាំង គ្រុនក្តៅ ឈឺសាច់ដុំ)

- តែមួយរយៈពេលខ្លី
- កម្រិតស្រាល

- តែមួយរយៈពេលខ្លី
- ជាទូទៅ ច្រើនក្រោយពីបានចាក់ដូសទីពីររួច

- តែមួយរយៈពេលខ្លី
- ជាទូទៅ ច្រើនក្រោយពីបានចាក់ដូសទីពីររួច

សុវត្ថិភាព (ដែលបានយល់ឃើញដោយអ្នកឯកទេសវេជ្ជសាស្ត្រ)

មាន

មាន

មាន

Khmer 3.17.21

សូមកត់សម្គាល់: ភាពខុសគ្នានៃការរចនាសាកល្បងនៅមន្ទីរពិសោធន៍ មានសារៈសំខាន់ក្នុងការប្រៀបធៀបប្រសិទ្ធភាពជាភាគរយ។

[kingcounty.gov/covid/vaccine/khmer](https://kingcounty.gov/covid/vaccine/khmer)