

Узнайте больше о вакцинах от COVID-19



	Johnson & Johnson	Pfizer / BioNTech	Moderna
СКОЛЬКО ПРИВИВОК ВАМ НУЖНО?	Одна доза	Две дозы, с интервалом три недели	Две дозы, с интервалом четыре недели
КОГДА ВЫ СЧИТАЕТЕСЬ ПОЛНОСТЬЮ ПРИВИТЫМИ И?	Через 2 недели после одной дозы	Через 2 недели после второй дозы	Через 2 недели после второй дозы
ЗАЩИТА ОТ ТЯЖЕЛОГО ТЕЧЕНИЯ БОЛЕЗНИ (включая госпитализацию и смерть)	Чрезвычайно эффективная	Чрезвычайно эффективная	Чрезвычайно эффективная
ЗАЩИТА ОТ ЛЕГКОГО И УМЕРЕННОГО ТЕЧЕНИЯ БОЛЕЗНИ (жар, озноб, кашель, боль в горле и т.д.)	Очень эффективная	Чрезвычайно эффективная	Чрезвычайно эффективная
ПРИЕМЛЕМЫЙ ВОЗРАСТ	18 лет и старше	16 лет и старше	18 лет и старше
АКТИВНЫЙ КОМПОНЕНТ	Аденовирус (обычный вирус простуды), модифицированный так, чтобы не вызывать болезнь	мРНК - генетический материал, вырабатываемый человеческим организмом	мРНК - генетический материал, вырабатываемый человеческим организмом
РАСПРОСТРАНЕННЫЕ ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ (в том числе боль или отек руки; усталость; жар; мышечные боли)	<ul style="list-style-type: none"> ♦ Длятся недолго ♦ Относительно слабые 	<ul style="list-style-type: none"> ♦ Длятся недолго ♦ Чаще возникают после второй дозы 	<ul style="list-style-type: none"> ♦ Длятся недолго ♦ Чаще возникают после второй дозы
БЕЗОПАСНОСТЬ (по мнению медицинских экспертов)	Да	Да	Да

Russian 3.17.21

Примечание. Различия в дизайне клинических испытаний делают сравнение эффективности в процентах менее целесообразным.

kingcounty.gov/covid/vaccine/russian