

Aprenda mas sobre las vacunas contra el COVID-19



	Johnson & Johnson	Pfizer/ BioNTech	Moderna
¿Cuántas dosis necesita?	Una dosis	Dos dosis, con tres semanas de diferencia	Dos dosis, Con cuatro semanas de diferencia
¿CUÁNDO SE CONSIDERA QUE ESTA TOTALMENTE VACUNADO?	2 semanas después de la vacuna	2 semanas después de la segunda dosis	2 semanas después de la segunda dosis
PROTECCIÓN CONTRA ENFERMEDADES GRAVES (incluyendo hospitalización y muerte)	extremadamente eficaz	extremadamente eficaz	extremadamente eficaz
PROTECCIÓN CONTRA ENFERMEDADES LEVES A MODERADAS (fiebre, escalofríos, tos, dolor de garganta, etc.)	altamente eficaz	extremadamente eficaz	extremadamente eficaz
EDADES ELEGIBLES	18 años o más	16 años o más	18 años o más
INGREDIENTE ACTIVO	Adenovirus (un virus del resfriado común), modificado para que no pueda causar enfermedades	ARNM, un material genético hecho por el cuerpo humano	ARNM, un material genético hecho por el cuerpo humano
EFFECTOS SECUNDARIOS COMUNES (incluyendo dolor o brazo hinchado; fatiga; fiebre; dolores musculares)	<ul style="list-style-type: none"> dura un corto tiempo Relativamente suave 	<ul style="list-style-type: none"> Dura un corto tiempo Mas común después de la segunda dosis 	<ul style="list-style-type: none"> Dura un corto Tiempo Mas común después de la segunda dosis
SEGURA (según determinado por los expertos)	Si	Si	Si

Spanish 3.17.21

Nota: Las diferencias en los diseños de los ensayos clínicos hacen que sea menos útil comparar la eficacia utilizando porcentajes.

kingcounty.gov/covid/vacunas