

Дізнайтеся більше про вакцини проти COVID-19



	Johnson & Johnson	Pfizer/ BioNTech	Moderna
СКІЛЬКИ ДОЗ ВАКЦИНИ ПОТРІБНО?	Одна доза	Дві дози, з інтервалом у три тижні	Дві дози, з інтервалом у чотири тижні
КОЛИ ВИ ВРАХОВУЄТЕСЬ ПОВНІСТЮ ЩЕПЛЕНИМ?	Через 2 тижні після прийому однієї дози	Через 2 тижні після прийому другої дози	Через 2 тижні після прийому другої дози
ЗАХИСТ ВІД ВАЖКИХ ЗАХВОРЮВАНЬ (Включаючи госпіталізацію та смерть)	Надзвичайно ефективна	Надзвичайно ефективна	Надзвичайно ефективна
ЗАХИСТ ВІД ХВОРОБ ЛЕГКОЇ ТА СЕРЕДНЬОЇ ТЯЖКОСТІ (лихоманки, ознобу, кашлю, болю у горлі тощо)	Високоєфективна	Надзвичайно ефективна	Надзвичайно ефективна
ДОПУСТИМИЙ ВІК	18 років та старше	16 років та старше	18 років та старше
АКТИВНИЙ ІНГРЕДІЄНТ	Аденовірус (вірус звичайної застуди), модифікований таким чином, що не може викликати хвороби	мРНК, генетичний матеріал, що виробляється організмом людини	мРНК, генетичний матеріал, що виробляється організмом людини
ЧАСТІ ПОБІЧНІ ЕФЕКТИ (включаючи біль або набряк руки; втому; лихоманку; болі в м'язах)	<ul style="list-style-type: none">• Тривають короткий час Порівняно м'які	<ul style="list-style-type: none">• Тривають короткий час Частіше після другої дози	<ul style="list-style-type: none">• Тривають короткий час - Частіше після другої дози
БЕЗПЕКА (за визначенням медичних експертів)	Так	Так	Так

Ukrainian 3.17.21

Примітка: Різниця в структурі клінічних випробувань робить менш корисним порівняння ефективності з використанням відсотків.

kingcounty.gov/covid/vaccine/ukrainian